



Humifirst WG

Humin- und Fulvosäuren

Beschreibung

Humifirst WG ist ein Mikrogranulat, das Humin- und Fulvosäuren enthält. Diese natürlichen Substanzen entstehen durch den Abbau von organischer Substanz und bilden den aktiven Anteil des Humus. Humifirst WG wird auf den Boden oder auf die Pflanzen gesprüht. Es kann mit löslichem Dünger gemischt werden.

Vorteile

Wirkung von Humifirst WG auf den Boden:

- Bessere Nährstoffverfügbarkeit
- Verbessert die Bodenstruktur
- Bessere Durchlüftung und Durchwurzelung des Bodens
- Verbesserte Wasserbindung bzw. Wasserhaltefähigkeit

Wirkung von Humifirst WG auf die Pflanze:

- Fördert das Wurzelwachstum
- Verbessert den Auflauf und die Erholung der umgepflanzten Setzlinge
- Der Feldaufgang erfolgt schneller und gleichmäßiger
- Reduziert Trockenstress
- Erhöht die Erntequalität und den Ertrag unter schwierigen Bedingungen

Zusammensetzung

Gesamte Huminstoffe	65 % g/g
Huminsäuren	53 % g/g
Fulvosäuren	12 % g/g

Physikalisch-chemische Eigenschaften

• Struktur	Mikrogranulat, hoch löslich
• Granulierung	< 200 µm Korngröße
• Farbe	schwarz
• pH	11,0

Hergestellt von Tradecorp

Parque Empresarial Cristalia,
C. Vía de los Poblados, 3, Edificio 5,
28033 Madrid

info.dach@rovensanext.com
www.rovensanext.de

Let's grow greener

CE

 **Rovensanext**

Aufwandmenge und Anwendung

Kultur	Kg/ha	Anwendungszeitpunkt
Getreide	2 x 2kg/ha	Anwendung zum Auflauf, 2. Anwendung EC 31/32
Raps	2 x 2 kg/ha	1. Anwendung zum Auflauf, 2. Anwendung EC 30
Kartoffel	2 kg/ha 3 kg/ha	Beim Kartoffeln legen in die Furche od. Zusammen mit Herbiziden auf den Damm spritzen
Zuckerrüben	1 kg/ha	Zu jeder NAK-Behandlung
Gemüse	2 kg/ha	Anwendung im Auflauf oder nach dem Pflanzen
Strohrotte/Zwischenfrucht	2 kg/ha	Auf das Stroh aufbringen und einarbeiten.
Gülle	2 kg /ha	In die Gülle einmischen.
Über Bewässerungssysteme	Gewächshaus	3-4 Tage nach Aussaat/Pflanzen mit 1 kg/ha. Nach und nach auf 300 g/Woche reduzieren.
	Im Feld	2-3 x 3 kg/ha mit dem ersten Bewässerungsgang nach der Aussaat oder der Pflanzung, Gesamtdosis 6-10 kg/ha

Mindestabstand zwischen den Anwendungen: 7-10 Tage
Mindestens 200 L/ha Wasser, höchstens 2000 L/ha Wasser

Dippen und Tauchen

Alle Kulturen	Tränken der Wurzeln in einer 1%igen Humifirst WG-Lösung (1 kg pro 100L Wasser)
---------------	--

Einarbeitung in die Pflanzerde

Alle Kulturen	Einarbeitung einer homogenen Mischung aus 1 kg Humifirst WG pro m ³ Pflanzenerde. Ggf. zur besseren Verteilung mit Wasser verdünnen.
---------------	---

